

# Chasse durable: Guide d'identification de la faune du Parc National du Mbam et Djerem.



# Pourquoi cette brochure?

Cette brochure est destinée aux communautés locales vivant en autour du Parc National du Mbam & Djerem. Ces populations locales dépendent depuis longtemps de la forêt pour la nourriture, le bois de chauffage, les traitements médicaux et d'autres produits. Maintenant que les villages se sont agrandis et que le couvert forestier a diminué, il est plus difficile que jamais de trouver un équilibre parfait entre l'utilisation des ressources naturelles et l'exploitation rationnelle de l'environnement.

Parmi ces ressources naturelles que ces populations exploitent, la viande de brousse joue un rôle primordial car permet de combler le déficit en protéines animales. Cependant, les animaux sont à l'état sauvage pour une raison précise. En effet, toutes les espèces, des fourmis aux éléphants en passant par les pangolins, jouent un rôle essentiel dans la santé de la forêt et sans elles, l'environnement peut rapidement devenir déséquilibré et disparaître. Ainsi, le gouvernement a établi des règles de chasse qui, la plupart du temps sont étrangères aux utilisateurs locaux des forêts, qui par conséquent les violent par ignorance



**Le Ngouroumoutou (le pangolin géant) est une espèce protégée évitons de le chasser**

## **La Loi de 1994: pourquoi est-ce qu'il est interdit de chasser certains animaux ?**

Cette loi très importante a été ratifiée en 1994. C'est la première loi du Cameroun qui restreint l'utilisation de la faune et elle est cruciale parce qu'elle catégorise les espèces en trois groupes :

- Espèces intégralement protégées (Classe A)
- Espèces partiellement protégées (Classe B)
- Espèces non protégées (Classe C)

### **Pourquoi est-ce que cette loi existe t-elle?**

Tous les pays du monde se doivent de gérer leur faune sauvage de façon convenable. Si les animaux et les habitats ne sont pas bien gérés, cela conduira à la surexploitation, et même à l'éventuelle disparition des espèces. L'extinction ou disparition est quand les derniers individus d'une espèce sont retirés de leur habitat naturel, soit par la chasse ou la capture. L'extinction d'une espèce est une grande perte environnementale car tel qu'il est décrit dans les pages précédentes, les animaux jouent des rôles cruciaux dans l'environnement ; c'est également une perte culturelle parce que les animaux ont joué et continuent à jouer de grands rôles dans les traditions locales à travers les esprits, les totems, les proverbes et les contes. La perte d'une espèce animale pour toujours signifie que nos enfants n'auront jamais l'opportunité de la voir ni même de l'entendre dans la nature.

C'est le cas du Rhinocéros d'Afrique de l'Ouest dont les derniers individus étaient toujours présents dans le Nord du Cameroun au début des années 2000s. Mais en 2010, l'animal a été déclaré disparu : il n'y aura plus jamais de rhinocéros sauvages au Cameroun.

## **Est-ce que la loi suffit?**

Il y avait encore plus de 100 rhinocéros dans les savanes boisées du Cameroun lorsque la loi de 1994 a été ratifiée. Malgré cette loi, ils ont tous été exterminés moins de 20 ans plus tard. Créer et signer des lois n'est pas suffisant si ces lois ne sont pas appliquées et renforcées.

## **Pourquoi certaines espèces sont-elles protégées ?**

Certaines espèces sont naturellement plus communes que d'autres. Le corbeau est très commun sur tout le Cameroun, tandis que le chimpanzé est naturellement rare parce qu'il se trouve seulement en forêt et qu'il vit sur de grands territoires. De plus, les chimpanzés n'ont pas beaucoup de petits. Tout comme nous, la femelle chimpanzé ne s'occupe que d'un petit pendant environ 6 ans. Durant ces 6 ans exclusifs avec sa mère, le bébé chimpanzé apprend à se déplacer, à choisir quelles plantes utilisées, etc. C'est la raison pour laquelle là où les chimpanzés sont chassés, leur population diminue brusquement : ils ne peuvent se reproduire rapidement. Par conséquent, les chimpanzés appartiennent à la Classe A, tandis que les corbeaux appartiennent à la Classe C. Tout comme le chimpanzé, le pangolin géant est également une espèce de Classe A car il ne fait qu'un seul petit/an. Le processus de reproduction des éléphants (Classe A aussi) est encore plus long: l'éléphante est gestante pendant plus d'un an!

En plus de tout cela, le contact avec certains animaux peut être très dangereux car ils transmettent des maladies graves pouvant causer la mort comme : EBOLA, le Coronavirus, le SIDA, la variole du singe et bien d'autres encore.

## **Identifiez ce que vous chassez, vendez et mangez de manière responsable !**

Lorsque vous achetez, mangez ou chassez de la viande de brousse, vous devez être capable d'identifier l'animal. Attention parce que “antilope” est un groupe d'animaux qui inclus des espèces protégées et des espèces qui peuvent être consommées. Essayez d'identifier l'espèce. Si l'animal est boucané, demandez au vendeur les caractéristiques de l'animal avant l'enfûmage. Vous devez être capable d'identifier l'animal afin de savoir si vous pouvez le consommer ou pas. C'est ce comportement qui nous permettra de léguer un riche environnementale à nos enfants.

, indiquant clairement leurs restrictions de chasse conformément aux lois camerounaises sur la faune ; de plus, cette brochure se concentre davantage sur les mammifères terrestres, bien que certaines espèces clés d'oiseaux soient mentionnées.

Dans le parc national de Mbam Djerem, les espèces animales ont des rôles très importants à différents niveaux. Les prédateurs, comme la civette, la panthère, sont les contrôleurs de la forêt. Ils régulent les populations de semeurs de graines, de pollinisateurs, de navigateurs et même d'autres contrôleurs. Leur présence est essentielle en forêt car elle permet d'éviter toute explosion de populations animales qui serait néfaste pour l'environnement.

En plus de ces rôles importants, tous les animaux nourrissent les plantes de la forêt en enrichissant le sol avec leurs excréments et leurs os, une fois morts. Dans un sens, les animaux se nourrissent de plantes autant que les plantes se nourrissent d'animaux.

# Limites de ce livret

Les espèces de mammifères et d'oiseaux présentées ici sont strictement indigènes du Parc National du Mbam et Djerem. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive des espèces sauvages des classes A, B et C documentées dans les lois sur la faune du Cameroun. Cependant, toutes les espèces de la région ne sont pas représentées. Pour toutes les espèces présentes mais non incluses, il est conseillé de vous référer au document sur les lois qui a une liste exhaustive des espèces de classe A et B.

Cette brochure fournit ainsi une large base de connaissances sur quelques espèces sauvages propres au Parc National du Mbam et Djerem et leurs classifications correspondantes conformément aux lois camerounaises sur la faune et un aperçu de quelques espèces des classes A, B et C.

Dans les pages suivantes, nous présenterons quelques espèces de mammifères et d'oiseaux de classe A, B et C qu'on trouve dans le Parc National du Mbam. Il faut toutefois garder à l'esprit que **la chasse l'intérieur du parc est strictement interdite ; de plus, les animaux de classe A sont strictement interdits de chasse, ceux de classe B nécessite un permis de chasse et ceux de classe C peuvent être chassés suivants des règles précises**

## QUELQUES MAMMIFERES DE CLASSE A



Pangolin géant (*Smutsia gigantea*)

Se rencontre dans les formations forestières primaires et secondaires des forêts tropicales humides, les forêts galeries, les forêts marécageuses, les habitats de mosaïque forêt-savane et la savane boisée



L'éléphant d'Afrique (*Loxodonta africana*) est le plus grand animal terrestre vivant avec des taureaux atteignant une hauteur d'épaule pouvant atteindre 3,96 m. Les deux sexes ont des défenses qui éclatent à l'âge de 1 à 3 ans



Le chimpanzé (*Pan troglodytes*) mesure en moyenne 1m70, pour un poids pouvant atteindre les 70 kg. La femelle est plus petite que le mâle et ils peuvent vivre jusqu'à 40 ans



Le **Potto de Bosman** (*Perodicticus potto*) est une espèce de primates lorisiformes. Il est pour certains auteurs la seule espèce du genre *Perodicticus*, alors que d'autres estiment que les sous-espèces connues doivent être élevées au rang d'espèces



La **loutre géante** est le plus grand des membres de la famille des mustélidés. Elle arbore un pelage très court dont le coloris varie de brun clair à marron foncé, voire rougeâtre. La densité du poil est telle que l'eau ne peut atteindre l'épiderme. ... La tête est ronde et le museau recouvert de fourrure,



*Anomalurus beecrofti* est une espèce d'**anomalures**, des mammifères rongeurs de la famille des Anomalurinae. C'est une espèce arboricole africaine qui fait partie des écureuils volants.



Le Léopard ou Panthère (*Panthera pardus*) est une espèce de félins de la sous-famille des panthérinés. Ce félin présente un pelage fauve tacheté de rosettes ; une forme mélanique existe également.



L'Oryctérope du Cap parfois appelé cochon de terre par traduction de son nom en afrikaans erdvark est un mammifère essentiellement termitivore d'Afrique, qui joue un rôle écologique important en contrôlant l'extension des populations de termites.



Le chevrotain aquatique (*Hyemoschus aquaticus*), également appelé biche-cochon constitue le seul chevrotain africain, les autres étant asiatiques. Il est également le plus grand des chevrotains. Il possède un pelage brun roux noirâtre.



Le **pangolin à ventre blanc** (*Phataginus tricuspis*) possède des poils au niveau du **ventre** et des écailles au niveau du dos. Ce **pangolin** habite les forêts de plaines tropicales humides et les mosaïques forêts-savanes.



Le chat doré africain est un chat sauvage de taille moyenne distribué à travers les forêts tropicales d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Il a une longueur d'environ 80 cm, dont plus de 30 cm de queue



Le pangolin à ventre noir (*Phataginus tetradactyla*) est le plus petit et le plus arboricole de toutes les espèces de pangolins d'Afrique centrale. Sa queue est beaucoup plus longue que celle du pangolin à ventre blanc, atteignant jusqu'à deux fois la longueur de son corps.

## QUELQUES OISEAUX DE CLASSE A



Le Gris du Gabon ou Perroquet jaco (*Psittacus erithacus*) est une espèce d'oiseaux de la famille des Psittacidae. C'est le meilleur parleur parmi les perroquets



L'aigle imperial a un plumage brun-noir avec une exception marquante pour les scapulaires - épaules- qui sont blanches. La queue est grise avec une large bande terminale noire est plus courte que celle de l'Aigle\_royal.



Le calao a casque jaune est surtout remarquable par ses rectrices extérieures entièrement blanches et par les motifs écaillés qui ornent son cou. Chez le mâle adulte, le capuchon et l'arrière de la tête sont recouverts de plumes noires ébouriffées

## QUELQUES MAMMIFERES DE LA CLASSE B



Civette Africaine (*Civettictis civetta*). La civette africaine est un animal omnivore dont l'alimentation se compose de fruits, mille-pattes, insectes, petits mammifères, oiseaux, reptiles, grenouilles, crabes et plantes. La volaille et les jeunes agneaux sont parfois consommés.



Hippopotame (*Hippopotamus amphibius*). Il s'agit d'un grand mammifère semi-aquatique, essentiellement herbivore, et ongulé originaire d'Afrique subsaharienne. C'est l'une des deux seules espèces existantes de la famille des Hippopotamidae



Le potamochoère (*Potamochoerus porcus*) mesure généralement entre 100 et 150 cm de haut pour un poids de 45 à 130 kg selon les individus. Il est roux et a une bande blanche dorsale et des aigrettes, le potamochoère du Cap présente une crinière distincte le long du cou et du dos. Les canines supérieures sont retroussées en défenses comme c'est le cas chez tous les suidés.



L'**hylochère** est un grand suidé mesurant entre 1,30 et 2,10 m de long et entre 75 et 110 cm de hauteur au garrot. Il pèse en moyenne entre 180 et 275 kg selon les individus. Il est doté d'une énorme tête large surmontée de grandes oreilles pointues et des poils hérissés sur le corps et la queue.



Le **buffle nain** (*Syncerus caffer nanus*) est la plus petite sous-espèce de **buffle** d'Afrique. Il ne dépasse pas les 320 kg, son pelage est brun rougeâtre, le visage est plus sombre et ses cornes sont moins développées que chez les autres sous-espèces.



Le **guib** ou **guib harnaché** (*Tragelaphus scriptus*) est une espèce de bovin de taille moyenne, à pelage roux portant un nombre variable de raies et de taches blanches sur le flanc. Il vit dans les forêts et les territoires d'arbustes en Afrique centrale et méridionale.




Bongo (*Tragelaphus euryceros*). Le bongo est un ongulé de forêt herbivore, principalement nocturne. Les bongos se caractérisent par un pelage brun rougeâtre frappant, des marques noires et blanches, des rayures blanc-jaune et de longues cornes légèrement spiralées.



Le **céphalophe à dos jaune** (*Cephalophus silvicultor*) est une des quinze espèces de céphalophes originaire du centre et de l'ouest de l'Afrique ayant l'aire de répartition la plus vaste. Il est également appelé Céphalophe géant.



Le Sitatunga (*Tragelaphus spekei*) est la plus aquatique des antilopes, ayant la faculté de se nourrir en étant partiellement voire complètement immergée dans l'eau. Cette antilope est proche des bongos, koudous et éléphants.



Le Babouin Doguera est un singe de taille moyenne dont le pelage paraît gris-vert de loin. Mais de plus près, le poil est multicolore et composé d'anneaux de poils brun, jaunes et noirs. Le mâle possède une crinière de poils qui part de la nuque vers la queue en s'effilant.



Le cobe de fassa (*Kobus ellipsiprymnus*) est une grande antilope dont la taille varie entre 1,77 et 2,35 m de long, de 1 à 1,30 m au garrot pour un poids allant de 160 à 300 kg. La queue mesure de 33 à 40 cm de long. Le dimorphisme sexuel est présent chez cette espèce, les mâles étant plus grands et plus lourds que les femelles.



Le cobe de Buffon est un mammifère ongulé dont la taille varie entre 1,25 et 1,80 m de long, de 80 à 110 cm de haut, pour un poids allant de 60 à 120 kg. La queue mesure de 20 à 40 cm de long. Les mâles étant plus grands et plus lourds que les femelles.

## QUELQUES OISEAUX DE CLASSE B



L'aigle couronné a une puissante stature et un bec fort. Il présente une double crête érectile souvent assez discrète et des pattes emplumées pourvues de grosses serres.



Le Cossyphe d'Isabelle est un oiseau qui appartient à la famille des Muscicapidés. Les Muscicapidés sont des passereaux de taille petite à moyenne (10 à 20 cm de longueur)



Le vautour africain est de taille moyenne et présente habituellement un plumage qui varie du brun-jaune au chamois avec des rémiges et une queue brun noirâtre, une collerette de plumes blanchâtres, un croupion et un bas du dos blancs.

## ESPECE DE CLASSE C

**ATTENTION:** les espèces de classe C sont dites communes mais leur chasse est autorisée par la réglementation en vigueur à l'effet de maintenir leur survie. De ce fait, évitons la chasse abusive et consommons moins de viande de brousse car cela peut constituer un danger pour notre santé, celle de nos proches et pour l'environnement autour de nous.



Mangabey à joues blanches (*Lophocebus albigena*). C'est un singe de l'Ancien Monde que l'on trouve dans les forêts d'Afrique centrale. Il a des joues grises et ressemble globalement à un petit babouin velu



Le vervet (*Cercopithecus aethiops*), tout comme ses cousins du même genre, est un singe de taille moyenne à la fourrure claire (vert-gris sur la partie supérieure du corps, beige sur la partie inférieure) et à face noire encadrée de poils clairs. Ses testicules sont bleus et son pénis est rouge.



Guenon moustachée  
(*Cercopithecus cephus*)  
tire son nom de la bande  
blanche brillante située entre  
le nez et la lèvre supérieure  
qui ressemble à une  
moustache

✖ Impossible d'afficher l'image.

Le singe rouge (*Erythrocebus patas*). a un pelage de couleur  
rouge mais le ventre, les  
membres et les pieds sont  
blancs. Il mesure entre 50 et 70  
cm et pèse de 7 à 13 kg. Le  
singe rouge détient le record du  
primate le plus rapide sur terre



Cercopithèque de Brazza  
(*Cercopithecus neglectus*) est  
un singe de l'Ancien Monde  
qui tire son nom de  
l'explorateur Savorgnan  
de **Brazza**. Connu localement  
comme le singe des marais, ils  
se trouvent souvent dans les  
zones humides en Afrique  
centrale



Impossible d'afficher l'image.

Le Cercopithèque pogonias (*Cercopithecus pogonias*) Le est une espèce de singes de la famille des cercopithécidés. C'est un cercopithèque arboricole qui vit dans l'ouest de l'Afrique centrale



Mone (*Cercopithecus mona*) possède une fourrure marron agouti avec un croupion blanc. Sa queue et ses pattes sont noirs et le visage est gris-bleu avec une ligne sombre sur le visage



La Genette commune (**Genetta genetta**), ou Genette d'Europe, est un mammifère carnivore nocturne et discret, de taille, couleur et morphologie qui la font parfois confondre avec un chat. Elle se répartit en de nombreuses sous-espèces vivant en Europe, en Afrique et au Proche-Orient.



Le hérisson ou « rats des roseaux » ou aulacode existe sous deux espèces : le grand et le petit aulacode. Il peut atteindre 8.5 kg adulte et est un animal d'élevage qui fournit une viande réputée



Le céphalophe à front noir (*Cephalophus nigrifrons*) est un petit mammifère mesurant entre 80 et 170 cm de long, environ 43 cm de haut pour un poids allant de 14 à 18 kg.



Le céphalophe bleu (*Philantomba monticola*) est un mammifère herbivore de la famille des bovidés. Son nom vient des reflets bleutés de son pelage. Il est le plus petit des espèces de céphalophes. Il vit en Afrique Centrale et en Afrique du Sud.

## QUELQUES OISEAUX DE CLASSE C



Le Tisserin gendarme (*Ploceus cucullatus*) est un grand tisserin muni d'un bec fort. le dimorphisme sexuel est bien marqué car en période de reproduction, le mâle nuptial est remarquable par ses couleurs, qui varient suivant les sous-espèces.



Astrild nonnette (*Estrilda nonnula*) est un oiseau qui appartient à la famille des Estrildidés.



Le corbeau pie (*Corvus albus*) possède un bec dont le culmen est légèrement courbé. Il est un peu plus fort que celui de la Corneille mantelée (*Corvus cornix*). De longues vibrisses nasales bien visibles ornent le dessous du bec. Les plumes hérissées de la gorge forment un camail assez discret.

## Soutien à l'aménagement du Parc National Mbam Djerem



Le Parc national de Mbam et Djerem (PNMD) qui couvre une superficie de 416 512 ha a été créé le 06 janvier 2000 comme compensation environnementale du projet Pipeline Tchad Cameroun. Il bénéficie de ce fait, du soutien financier de la Fondation pour l'Environnement et le Développement au Cameroun (FEDEC) depuis 2003 pour la mise en œuvre de ses activités.

Etiré entre les régions de l'Adamaoua, de l'Est et du Centre du Cameroun, le Parc National du Mbam et Djerem est situé dans la zone de transition forêt-savane, laquelle lui confère une diversité biologique exceptionnelle caractérisée par une diversité d'habitats, et d'espèces animales notamment des mammifères parmi lesquels on retrouve des espèces menacées telles : l'éléphant, le chimpanzé, le Colobe guereza, des reptiles, des poissons, des amphibiens, d'oiseaux et une grande variété de formations végétales. Le PNMD fait face à de multiples pressions et menaces au nombre desquelles l'enclavement et la pauvreté ambiante, le braconnage et le commerce des espèces menacées, le pacage du bétail, les impacts négatifs des projets industriels en périphérie qui risquent fort de compromettre la survie de ce précieux patrimoine naturel.

Avec le soutien financier de la FEDEC, le projet d'aménagement du Parc national du Mbam et Djerem depuis est mis en œuvre par l'ONG américaine Wildlife\_Conservation\_Society (WCS) depuis 2003.

Au terme d'une dizaine d'années d'intervention grâce aux efforts conjugués du Ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF), de la FEDEC et de WCS, les activités ont été mises en œuvre dans le Parc national de Mbam et Djerem:

- La protection du parc et l'éducation à la conservation
- La recherche et le suivi écologique et socio-économique
- La valorisation des ressources et la cogestion
- La renforcement des capacités du Service de la conservation (MINFOF)

# Chasse durable: Guide d'identification de la faune du Parc National du Mbam et Djerem.

Le but de ce guide est de fournir aux population vivant autour du Parc National du Mbam et Djerem et dependant principalement des ressources forestières un guide d'identification de quelques espèces de mammifères et d'oiseaux reparties dans les différentes classes de protection des animaux telle que régit par la loi camerounaise.

Le but ultime de se guide est de permettre aux populations locales de pouvoir identifier ce qu'ils chassent, où ils chassent, ce qu'ils vendent et enfin ce qu'ils consomment afin de pouvoir faire la distinction entre ce qui peut être chassé et ce qui ne doit pas être chassé. Cette brochure doit donc être utilisée subtilement à des fins d'une exploitation raisonnable des ressources encore disponibles dans le paysage écologique du Parc National du Mbam et Djerem.